

- 1- Conforme al artículo 148 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de:
- A) Inmigración.
 - B) Extranjería.
 - C) Derecho de asilo.
 - D) Sanidad e higiene.
- 2- Conforme al artículo 134.3 de la Constitución Española, el Gobierno deberá presentar los Presupuestos Generales del Estado:
- A) Ante el Congreso de los Diputados, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
 - B) Ante las Cortes Generales, al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior.
 - C) Ante cualquiera de las Cámaras, al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
 - D) Ante cualquiera de las Cámaras, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
- 3- Conforme al artículo 78 de la Constitución Española:
- A) Necesariamente habrá de constituirse una Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, siendo opcional su constitución en el Senado.
 - B) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros.
 - C) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de treinta y uno miembros.
 - D) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se compondrá de un máximo de treinta y uno miembros.
- 4- Conforme al artículo 70 de la Constitución Española, son inelegibles como diputados:
- A) Los secretarios de Estado.
 - B) Los alcaldes.
 - C) Los miembros de las juntas electorales.
 - D) Los presidentes de las diputaciones provinciales.
- 5- Señale la afirmación correcta conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados:
- A) La Presidencia del Congreso de los Diputados tiene voto de calidad en las decisiones de la Mesa de la Cámara
 - B) La Mesa del Congreso de los Diputados adopta sus decisiones en función del criterio de voto ponderado
 - C) La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados adopta sus decisiones en función del criterio de voto ponderado.
 - D) La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados adopta sus decisiones por mayoría simple de sus miembros.
- 6- El Pleno del Congreso de los Diputados está formado por:
- A) Todos los diputados.
 - B) La Presidencia y todos los miembros de la Mesa de la Cámara.
 - C) Todos los diputados y todos los senadores.
 - D) La suma de cada uno de los miembros de todas las Comisiones de la Cámara.
- 7- Los Proyectos y Propositiones de Ley, en el Congreso de los Diputados, una vez enviados a la Comisión competente por razón de la materia, se debaten en:
- A) La Subcomisión designada al efecto.
 - B) La Ponencia que se constituye en el seno de la Comisión.
 - C) La Ponencia constituida en el seno de la Subcomisión competente.
 - D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

8- Según el artículo 40.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- A) Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los partidos políticos en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.
- B) Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los grupos parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.
- C) Las Comisiones, estarán formadas por los miembros que designe la Mesa del Congreso, oídos los grupos parlamentarios, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.
- D) Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designe la Junta de Portavoces, oídos los partidos políticos, en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.

9- La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados se estructura en:

- A) Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior, Departamento de Prevención de Riesgos laborales y Departamento de Igualdad.
- B) Departamento de Gestión de Personal, Departamento de Acción Social y Gobierno Interior y Departamento de Igualdad.
- C) Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior, Departamento de Acción Social y Departamento de Igualdad, Prevención y Salud Laboral.
- D) Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior, Departamento de Acción Social y Prestaciones Sociales y Departamento de Igualdad y Prevención Laboral.

10- Según el artículo 35 del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- A) La Mesa estará asesorada por el Letrado Mayor, cuyo nombramiento se realizará por la misma, a propuesta de su Presidente, entre los Letrados de las Cortes con más de quince años de servicios efectivos.
- B) La Mesa estará asesorada por el Letrado Secretario General, cuyo nombramiento se realizará por la misma, a propuesta de su Presidente, entre los Letrados del Congreso con más de quince años de servicios efectivos.
- C) La Mesa estará asesorada por el Secretario General, cuyo nombramiento se realizará por la Presidencia, entre los Letrados del Congreso con más de cinco años de servicios efectivos.
- D) La Mesa estará asesorada por el Letrado Secretario General, cuyo nombramiento se realizará por la misma, a propuesta de su Presidente, entre los Letrados de las Cortes con más de cinco años de servicios efectivos.

11- Cuando una gestante presenta hipertensión arterial, proteinuria y edemas, estamos ante una:

- A) Eclampsia.
- B) Preeclampsia.
- C) Hipertensión arterial gravídica.
- D) Síndrome de Hellp.

12- Una de las siguientes no es una contraindicación absoluta para la traqueotomía percutánea:

- A) Cirugía previa de cuello
- B) Inestabilidad cervical
- C) Coagulopatía no controlada
- D) Infección en el punto de inserción

13- En un paciente inmunocompetente con infección aguda por Citomegalovirus el tratamiento indicado es:

- A) Ganciclovir
- B) Antibióticos de amplio espectro y Ganciclovir
- C) Tratamiento sintomático
- D) Corticoides

14- En el Servicio de Urgencias de un hospital de la Comunidad de Madrid, ingresa una mujer de 47 años con un cuadro de tos, saturación de 90% y fiebre de 39,5 grados, las medidas de seguridad ante una posible enfermedad infecciosa son:

- A) Colocar una mascarilla de O2 al 50% y 6 litros a la paciente, encima de dicha mascarilla de O2 colocaremos una mascarilla quirúrgica de protección.
- B) El personal de enfermería y el resto del personal sanitario que vayamos a atenderle se pondrán una mascarilla y guantes.
- C) Ante la sospecha de una enfermedad infecciosa intentaremos ingresar al paciente en una habitación de presión negativa.
- D) Todas las respuestas anteriormente citadas son correctas.

15- ¿Qué hallazgo de laboratorio espera encontrar en una paciente con anorexia nerviosa que realiza - continuos vómitos?

- A) Hiperpotasemia
- B) Hipocloremia
- C) Disminución de bicarbonato sérico
- D) Hipoamilasemia

16- ¿Cuál es el reservorio de Salmonella typhi A en una persona portadora?

- A) Intestino grueso
- B) Intestino delgado
- C) Divertículos de colon
- D) Vesícula biliar

17- Ingresa en la Urgencia de un hospital de la Comunidad de Madrid, un varón de 49 años, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tras una caída de su bicicleta, llevaba casco y ha estado inconsciente unos 5 minutos. Presenta el siguiente Glasgow: apertura ocular al dolor reactiva al estímulo verbal, en cuanto a la respuesta motora; obedece órdenes, y respecto a la respuesta verbal: está desorientado y confuso. La puntuación que le asignáis y el tipo de trauma que puede ser:

- A) Un Glasgow de 12; trauma moderado
- B) Un Glasgow de 15 ; trauma leve
- C) Un Glasgow de 13; trauma leve
- D) Un Glasgow de 11; trauma moderado

18- La endocarditis de Libman-Sacks está asociada a:

- A) Pacientes drogodependientes por vía parenteral
- B) Cardiopatía reumática
- C) Lupus eritematoso sistémico
- D) Enfermedad de Lyme

19- El vasopresor de elección para mantener la presión de perfusión en un enfermo con shock séptico es:

- A) Dopamina
- B) Noradrenalina
- C) Dobutamina
- D) Fenilefrina

20- La asociación de fármacos IECAS y antagonistas de la aldosterona puede ser útil en pacientes con insuficiencia cardiaca, no obstante deberemos vigilar especialmente:

- A) Que pueden aumentar paradójicamente la tensión arterial
- B) La aparición o agravamiento de dislipemias
- C) Los niveles de bradicininas circulantes
- D) La aparición de hiperpotasemia

21- Las ramas del nervio vago entran en la cavidad abdominal a través del:

- A) Hiato esofágico
- B) Hiato aórtico
- C) Orificio vena cava inferior
- D) Ligamento arqueado lateral

22- Desde el punto de vista anatomopatológico un granuloma es:

- A) Un agregado de células plasmáticas
- B) Sinónimo de tejido de granulación
- C) Un agregado de linfocitos
- D) Un agregado de histiocitos

23- A un paciente con claudicación intermitente por arteriopatía oclusiva periférica se le recomendará:

- A) Reposo absoluto para disminuir la demanda de oxígeno
- B) Usar medias de compresión gradual
- C) Caminar por superficies planas
- D) Elevar las piernas para reducir el dolor

24- La localización más frecuente de la trombosis venosa profunda es:

- A) Sector femoral en el muslo
- B) Sector iliaco
- C) Plexos venosos de los músculos sóleos
- D) Vena cava inferior

25- Ante un paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Críticos con gafas de alto flujo nasal, señala la respuesta incorrecta respecto a este sistema de administración de O₂:

- A) Vigilar la temperatura del sistema y mantendremos las tubuladuras en posición de ascenso para que el agua no fluya hacia la cánula nasal.
- B) Hidrataremos las mucosas y vigilaremos el patrón respiratorio para detectar posibles cambios.
- C) Son cánulas diseñadas para administrar hasta 60lpm
- D) Permiten la administración de hasta un 100% de oxígeno de forma más precisa

26- ¿Cuál es la principal contraindicación para el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en el tratamiento de la disfunción eréctil?

- A) Empleo asociado de metformina
- B) Uso concomitante de nitratos
- C) Antiagregación con ácido acetil salicílico
- D) Tratamiento simultáneo con simvastatina

27- Interpretar el resultado de la siguiente gasometría: pH de 7.32; PCO₂ de 52mmHg y un HCO₃ de 26mEq/L. Esta gasometría indica una:

- A) Acidosis respiratoria
- B) Acidosis metabólica
- C) Alcalosis respiratoria
- D) Alcalosis metabólica

- 28- ¿Cuál de las siguientes arterias no es rama de la arteria carótida externa?
- A) Arteria facial
 - B) Arteria lingual
 - C) Arteria oftálmica
 - D) Arteria temporal superficial
- 29- ¿Cuál de estos fármacos está contraindicado en embarazadas por el riesgo de malformaciones congénitas?
- A) Gentamicina
 - B) Isotretinoína
 - C) Alfa metildopa
 - D) Dexametasona
- 30- ¿Cuál es el medicamento más indicado para el tratamiento del shock anafiláctico?
- A) Corticoides
 - B) Adrenalina
 - C) Antihistamínicos
 - D) Benzodiacepinas
- 31- El síndrome del túnel carpiano se debe al atrapamiento o compresión del nervio:
- A) Mediano
 - B) Cubital
 - C) Radial
 - D) Braquial
- 32- Cuando hablamos del par craneal V, nos referimos al:
- A) Hipogloso
 - B) Motor ocular común
 - C) Olfatorio
 - D) Trigémino
- 33- En la escala de Norton para valoración del riesgo de úlcera por presión ¿Cuál de los siguientes parámetros no se valora como factor de riesgo?
- A) Incontinencia
 - B) Movilidad
 - C) Actividad
 - D) Edad
- 34- La acetil cisteína se utiliza de antídoto de las intoxicaciones por:
- A) Mórnicos
 - B) Aspirina
 - C) Paracetamol
 - D) Benzodiacepinas
- 35- Ante un hemotórax con riesgo vital, se procederá a toracocentesis de emergencia por:
- A) 2º-3º espacio intercostal línea medio claviclar
 - B) 2º-3º espacio intercostal línea medio axilar
 - C) 4º-5º espacio intercostal línea medio axilar
 - D) 6º-7º espacio intercostal línea medio axilar
- 36- La afectación extraintestinal más frecuente de la amebiasis invasiva afecta a:
- A) Pulmón
 - B) Hígado
 - C) Cerebro
 - D) Riñón

37- Las siguientes alteraciones cursan con tiempo de protrombina prolongado excepto una:

- A) Deficiencia factor VII
- B) Deficiencia de proteína S
- C) Anticoagulación con warfarina
- D) Deficiencia de vitamina K

38- En la profilaxis de endocarditis bacteriana en pacientes adultos con lesiones cardiacas de alto riesgo y alérgicos a la penicilina ¿Qué antibiótico oral de los siguientes no se utiliza?

- A) Claritromicina
- B) Ciprofloxacino
- C) Azitromicina
- D) Clindamicina

39- En las mordeduras animales ¿Qué antibiótico se suele recomendar como tratamiento alternativo en los pacientes alérgicos a penicilina?

- A) Claritromicina
- B) Ampicilina/sulbactam
- C) Doxiciclina
- D) Vancomicina

40- ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos está asociado más frecuentemente con el desarrollo de Sd. de Guillain-Barré?

- A) Citomegalovirus
- B) Virus de Epstein-Barr
- C) Campylobacter jejuni
- D) Virus Varicela-Zoster

41- ¿Cuál de los siguientes puntos no es correcto al hablar de los IECAS?

- A) Pueden producir hipotensión ortostática
- B) El angioedema es más frecuente en pacientes de raza negra que en blancos
- C) Pueden producir tos hasta en el 20% de los pacientes
- D) No hay que ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal

42- ¿Dónde se debe colocar la sonda para medir temperatura esofágica en un paciente con hipotermia e inconsciente?

- A) Esófago proximal
- B) Esófago medio
- C) Esófago distal
- D) Todas son correctas

43- Se considera prediabetes o aumento del riesgo para diabetes (Hiperglucemia intermedia) a los pacientes cuya hemoglobina glicosilada (HbA1C) es:

- A) Mayor de 6,5%
- B) Entre 5,7% y 6,4%
- C) Entre 5% y 5,6%
- D) Todas son falsas

44- Respecto de la Diabetes gestacional ¿cuál de las siguientes es incorrecta?

- A) Aparece intolerancia a la glucosa en el primer trimestre de gestación
- B) Tras el parto las cifras de glucemia suelen volver a la normalidad
- C) Tienen más posibilidades de padecer prediabetes o diabetes en los próximos 10-20 años
- D) La resistencia a la insulina y aumento de demanda de insulina están relacionados con el embarazo

- 45- ¿Cuál de las siguientes premisas no es necesaria para una correcta toma de tensión arterial?
- A) Respaldo dorsal
 - B) Piernas sin cruzar y pies apoyados en el suelo
 - C) Ayuno de 30 minutos
 - D) Reposo previo de 5 minutos sentado
- 46- ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha dejado de utilizar en la Reanimación Cardio Pulmonar?
- A) Adrenalina
 - B) Amiodarona
 - C) Vasopresina
 - D) Atropina
- 47- ¿Qué test diagnóstico ha probado reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en individuos de alto riesgo?
- A) Rx tórax con análisis citológico de esputo anual
 - B) Rx tórax cada dos años
 - C) TAC de baja dosis anual
 - D) Combinación de TAC y PET
- 48- ¿Cuál de las siguientes no suele ser una complicación de la intoxicación por opiáceos?
- A) Hipertermia
 - B) Convulsiones
 - C) Neumonía por aspiración
 - D) Rabdomiolisis
- 49- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre dermatitis atópica es cierta?
- A) Los pacientes afectados de dermatitis atópica tienen más riesgo de desarrollar otros procesos alérgicos
 - B) La raza o grupo étnico no parece influenciar las características clínicas de la enfermedad
 - C) Su prevalencia está disminuyendo en los países más desarrollados
 - D) Con el incremento de edad del paciente las lesiones tienden a ser menos circunscritas y más diseminadas
- 50- ¿Cuál de los siguientes no es un virus RNA?
- A) Hepatitis A
 - B) Hepatitis B
 - C) Hepatitis C
 - D) Hepatitis E
- 51- ¿Cuál es la causa más frecuente de la pancreatitis aguda?
- A) Alcohol
 - B) Hipertrigliceridemia
 - C) Litiasis biliar
 - D) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- 52- En relación al uso adecuado de los EPIS señala la respuesta incorrecta:
- A) El material de protección individual incluye: Una bata impermeable, una mascarilla FFP2, guantes de nitrilo, gafas y solución hidroalcohólica
 - B) Antes de colocar el EPI se debe hacer lavado de manos con solución alcohólica
 - C) El EPI se retira antes de salir de la habitación y se deja en el material de residuos especiales, excepto la mascarilla de protección que no nos la retiraremos fuera de la habitación del paciente
 - D) El orden de colocación del material es : 1º guantes, 2º bata impermeable, 3º mascarilla FFP2 y 4º finalmente el protector ocular

- 53- ¿Cuál de los siguientes medicamentos no es tratamiento de primera línea en la neuropatía sensorial dolorosa?
- A) Antidepresivos tricíclicos
 - B) Carbamazepina
 - C) Pregabalina
 - D) Duloxetina
- 54- Entre las complicaciones cardiovasculares del consumo de cocaína no se encuentra:
- A) Taquicardia
 - B) Trombosis
 - C) Vasodilatación coronaria
 - D) Hipertensión
- 55- Después del cáncer de pulmón ¿Cuál es el más frecuente en los varones fumadores?
- A) Cáncer de vejiga
 - B) Cáncer de esófago
 - C) Cáncer de laringe
 - D) Cáncer de riñón
- 56- En la fascitis plantar ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo?
- A) Obesidad
 - B) Insuficiencia venosa de miembros inferiores
 - C) Pie plano
 - D) Pie cavo
- 57- De los siguientes fármacos ¿Cuál no está relacionado con la aparición de tendinitis o rotura tendinosa?
- A) Quinolonas
 - B) Beta lactámicos
 - C) Glucocorticoides
 - D) Estatinas
- 58- Entre las complicaciones de la cirrosis hepática ¿Cuál de las siguientes no está directamente relacionada con la hipertensión portal?
- A) Varices esofágicas
 - B) Esplenomegalia
 - C) Encefalopatía hepática
 - D) Ascitis
- 59- En la intoxicación por paracetamol no es útil:
- A) Lavado gástrico
 - B) Carbón activado
 - C) Acetil cisteína
 - D) Glucocorticoides
- 60- Cual de los siguientes tipos de monitorización sistémica consideramos no invasiva:
- A) La PAI y PVC
 - B) La PNI y SatO2
 - C) GC y PAI
 - D) PNI y PAI
- 61- Entre las causas de hiperpigmentación difusa de origen endocrina no se encuentra:
- A) Hiperparatiroidismo
 - B) Enfermedad de Addison
 - C) Síndrome de Nelson
 - D) Hipertiroidismo

- 62- El nódulo de Virchow es:
- A) Un ganglio inguinal de origen indeterminado
 - B) Un ganglio supraclavicular izquierdo aumentado por metástasis de un tumor gastrointestinal primario
 - C) Un ganglio axilar derecho aumentado secundario a cáncer de mama
 - D) Un ganglio preauricular de origen infeccioso
- 63- ¿Cuál de las siguientes no suele ser una causa de cianosis periférica?
- A) Obstrucción venosa
 - B) Exposición al frío
 - C) Shock
 - D) Toma de fármacos calcioantagonistas
- 64- ¿Cuál es la causa más frecuente de ascitis?
- A) Carcinomatosis peritoneal
 - B) Cirrosis hepática
 - C) Tuberculosis
 - D) Pancreatitis
- 65- La ubicación más adecuada para la punta de los catéteres centrales de inserción periférica (PICC) es:
- A) Parte superior de vena cava superior
 - B) La unión de vena braquiocefálica izquierda y vena cava superior
 - C) El tercio inferior de vena cava superior próxima a la unión de dicha vena con la aurícula derecha
 - D) Contigua a la pared lateral de la parte superior de vena cava superior
- 66- Para conseguir una absorción más rápida con la inyección subcutánea de insulina de acción rápida preprandial ¿Qué zona sería la más indicada?
- A) Parte alta de las nalgas
 - B) Pared abdominal no periumbilical
 - C) Parte superior y lateral del brazo
 - D) Parte lateral interna del muslo
- 67- En relación canalización de la presión arterial invasiva señala la respuesta incorrecta:
- A) Permite el control intermitente de la PA a través de un catéter arterial conectado a un transductor de presión
 - B) Los principales objetivos de esta monitorización son: medir la TA sistémica y la extracción de analíticas y gasometrías seriadas
 - C) El sistema se debe calibrar c/8 horas o cada vez que cambie la posición del transductor con respecto al eje flebostático
 - D) La morfología de la curva de la presión arterial indica la presión arterial sistólica, media, diastólica y el cierre de la válvula aórtica
- 68- ¿Cuál de los siguientes parámetros no se mide en APACHE II?
- A) Creatinina
 - B) Sodio
 - C) Potasio
 - D) Calcio
- 69- ¿Cuál de los siguientes no es un test o escala de riesgo para las úlceras de presión?
- A) Norton
 - B) Emina
 - C) Braden
 - D) Scoof

70- ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado durante el embarazo?

- A) Losartan
- B) Propranolol
- C) Nifedipino
- D) Alfa metildopa

71- Indique la opción correcta en relación con el golpe precordial en presencia de una parada cardíaca:

- A) Su uso rutinario está recomendado
- B) Se administra un impacto seco en la mitad superior del esternón
- C) Se aplica con el borde cubital y el puño fuertemente apretado desde una altura de 20 cm
- D) Está indicado en una parada cardíaca de un paciente no monitorizado

72- En relación a la medición y valores de la PVC señala la respuesta correcta:

- A) La PVC es la fuerza que ejerce la sangre a nivel de la AD, representando la presión de llenado del VD o presión diastólica final del VD.
- B) La medida se realiza a través de un CVC (subclavia, yugular, PICC) cuyo extremo distal queda alojado en la vena cava superior
- C) Los valores normales oscilan entre 2 - 10 cm H₂O o 6 - 12 mmHg.
- D) Todas las respuestas son correctas

73- De los siguientes fármacos para el tratamiento tópico de la epistaxis ¿Cuál no tiene efecto vasoconstrictor?

- A) Oximetazolina
- B) Epinefrina
- C) Ácido tranexámico
- D) Fenilefrina

74- En la escala de Glasgow de adultos no se valora:

- A) Apertura de ojos
- B) Temperatura corporal
- C) Respuesta verbal
- D) Respuesta motora

75- El Índice de Barthel se utiliza para:

- A) Medir la capacidad de la persona en diez actividades básicas de la vida diaria
- B) Medir las condiciones de la piel perilesional de una herida
- C) Mide el riesgo de sufrir una caída
- D) Mide el riesgo de úlcera de presión que presenta el paciente

76- Una mujer de 80 años, con antecedentes de demencia senil leve, sufre una fractura de cadera y está pendiente de cirugía. Está siendo tratada con morfina intravenosa, con buen control del dolor pero con excesiva sedación, confusa y desorientada con agitación. ¿Qué se debe hacer con el tratamiento?

- A) Parar la morfina y poner Haloperidol
- B) Continuar con la misma dosis de morfina y añadir Loracepam
- C) Reducir la dosis de morfina y considerar otros analgésicos no opiáceos
- D) Continuar con la misma dosis de morfina y añadir Haloperidol

77- ¿Cuál de las siguientes no es una complicación del taponamiento nasal?

- A) Síndrome de apnea del sueño
- B) Perforación septal
- C) Taquiarritmias
- D) Síndrome shock tóxico

78- ¿Cuál de los siguientes pasos es el más apropiado para una niña de once meses que es llevada a Urgencias, tras haberse caído de la cama, sin presentar pérdida de conciencia, alteración del estado mental ni vómitos y que aparenta estar bien salvo por una herida en la frente?

- A) Observación durante unas pocas horas y alta a domicilio
- B) Hacer RMN cerebral
- C) Hacer Radiografía craneal
- D) Hacer TAC craneal

79- Deberemos proceder con cuidado en la toma de exudado nasofaríngeo en pacientes con:

- A) Traumatismo nasal o cirugía reciente
- B) Tabique nasal muy desviado
- C) Coagulopatía severa
- D) Todas son correctas

80- En el suicidio de adolescentes ¿Cuál de los siguientes factores ambientales de riesgo es el menos importante?

- A) Factores económicos
- B) Falta de soporte social
- C) Efecto de redes sociales
- D) Acceso a medios letales

81- Respecto de la intoxicación crónica por salicilatos no es cierto:

- A) Suele ocurrir en pacientes tratados con ácido acetil salicílico que además toman otras medicaciones que contienen salicilatos como antigripales, etc
- B) Es más frecuente en pacientes ancianos que son cuidados por más de un médico
- C) La enfermedad renal previa y la hipoalbuminemia son factores predisponentes
- D) La agitación, confusión, alucinaciones y coma son más frecuentes en la intoxicación aguda que en la crónica

82- En la hipertensión aguda severa no es cierto:

- A) No tomar la medicación prescrita es la causa más frecuente en la hipertensión aguda severa
- B) Cuando la hipertensión aguda severa va acompañada de afectación de órganos diana, requiere tratamiento inmediato e ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos
- C) Las tomas oscilométricas y con esfigmomanómetro y fonendo subestiman las cifras de tensión arterial en los pacientes con hipertensión aguda severa
- D) En las urgencias hipertensivas (hipertensión aguda severa sin afectación de órganos diana) está indicado el tratamiento intravenoso

83- El sistema de monitorización PiCCO es:

- A) Un sistema que mide el GC por termodilución transpulmonar inyectando suero frío a través de un catéter central.
- B) Un sistema que mide el GC por termodilución transpulmonar inyectando suero caliente a través de un catéter central.
- C) Un sistema que mide el GC por termodilución extrapulmonar inyectando suero frío a través de un catéter central.
- D) Un sistema que mide la PVC por termodilución transpulmonar inyectando suero frío a través de un catéter central.

84- ¿Cuál de las siguientes sustancias cáusticas no es un álcali clásico?

- A) Hidróxido de amonio
- B) Fenol
- C) Hidróxido de sodio
- D) Hipoclorito sódico

- 85- En un dolor de cabeza no es típico de la migraña:
- A) Aparición nocturna
 - B) Dolor unilateral
 - C) Pulsátil
 - D) Desencadenado con el ejercicio frecuentemente
- 86- Respecto del trastorno bipolar ¿Cuál es incorrecta?
- A) El comienzo del trastorno bipolar típicamente ocurre alrededor de los 20 años
 - B) Un comienzo temprano suele estar asociado a un peor pronóstico
 - C) Las fases maníacas suelen durar más que las fases depresivas
 - D) Un tercio de los pacientes no son diagnosticados hasta diez años después del inicio de los síntomas
- 87- En el tratamiento de la osteoartritis de rodilla no es importante:
- A) Pérdida de peso
 - B) Actividad física incluyendo ejercicios aeróbicos o neuromusculares
 - C) Utilización de AINES preferiblemente tópicos
 - D) Magnetoterapia
- 88- Si en un paciente con disnea vemos que no hay elevación de la presión venosa y el test de reflujo abdomino-yugular es menor de 4 cm. es probable que la causa no sea de origen:
- A) Pulmonar
 - B) Renal
 - C) Cardíaco
 - D) Hepático
- 89- Respecto a la administración de analgésicos, en el paciente terminal, se denomina dosis de rescate a:
- A) La administración a horas fijas
 - B) La administración a demanda del paciente
 - C) Administrar una dosis extra, entre dos dosis fijas, por la aparición de un episodio doloroso imprevisto
 - D) Todas son falsas
- 90- Cuando un paciente lleva más de 48 horas en fibrilación auricular y decidimos hacer cardioversión, deberemos:
- A) Desfibrilación eléctrica lo antes posible
 - B) Dar Flecainida oral
 - C) Anticoagular antes y después de la cardioversión aunque no haya factores de riesgo de ictus
 - D) Hacer maniobras vagales
- 91- En un paciente que presenta coloración verdosa en su orina puede estar ocasionado por todas las siguientes razones excepto:
- A) Ictericia obstructiva
 - B) Ingesta de espárragos en las últimas 12 horas
 - C) Medicación como Propofol o Indometacina
 - D) Infección urinaria por Pseudomonas
- 92- De los diferentes tipos de neuralgia del trigémino ¿Cuál es la más frecuente?
- A) Idiopática
 - B) Secundaria
 - C) Clásica
 - D) Todas tienen similar incidencia

- 93- En los accidentes cerebrovasculares agudos de origen isquémico nos deberemos guiar para su tratamiento de todas excepto:
- A) Tiempo de comienzo del ictus
 - B) Severidad del déficit neurológico
 - C) Sintomatología en las 48 horas previas
 - D) Hallazgos en los estudios de neuroimagen
- 94- En la cardiopatía congénita del Síndrome de Down ¿Cuál es la patología más frecuente?
- A) Tetralogía de Fallot
 - B) Ductus arteriosus patente
 - C) Comunicación interauricular
 - D) Comunicación atrio-ventricular
- 95- ¿Cuál de las siguientes no es cierto respecto a las picaduras por chinches?
- A) Pueden transmitir agentes infecciosos a los humanos como Rickettsiosis, etc
 - B) Pican en la piel expuesta durante el sueño para alimentarse de la sangre
 - C) Los métodos mecánicos (calor o frío) son necesarios para su erradicación, a veces combinados con insecticidas
 - D) El diagnóstico se realiza cuando el paciente acude al médico por las lesiones dérmicas
- 96- Dentro del aumento de enfermedades de transmisión sexual ¿Cuál de estos patógenos no es causante de uretritis?
- A) Mycoplasma genitalium
 - B) Neisseria gonorrhoeae
 - C) Neisseria meningitidis
 - D) Shigelosis
- 97- ¿Cuáles de los siguientes síntomas no son frecuentes en el Accidente Isquémico Transitorio?
- A) Síntomas focales cerebrales o retinianos de duración de segundos o minutos y duración menor de una hora
 - B) Debilidad en dos extremidades o en una extremidad y la cara
 - C) Déficit sensorial parcial en una extremidad o en la cara
 - D) Afasia o disartria
- 98- Ante la sospecha de un Accidente Isquémico Transitorio deberemos:
- A) Tranquilizar al paciente y decirle que pida consulta con Neurología
 - B) Poner heparina de bajo peso molecular
 - C) Administrar 300 mg. de aspirina y remitir a Urgencias hospitalarias
 - D) Administrar tratamiento con aspirina y Clopidogrel y recomendar consulta con Neurología antes de 72 horas
- 99- En la patogénesis de la endometriosis se ha postulado alguno de los siguientes procesos excepto:
- A) Infecciones bacterianas y fúngicas de repetición en vías urinarias y ginecológicas
 - B) Menstruación retrógrada
 - C) Metaplasia celómica
 - D) Metástasis vascular y linfática
- 100- Respecto de la instauración de un acceso venoso periférico ¿Cuál no es correcta?
- A) El calibre estándar oscila entre el 14G y el 26G. El número es inversamente equivalente al grosor de la aguja
 - B) Los catéteres de teflón y poliuretano presentan más complicaciones infecciosas que los de cloruro de polivinilo o polietileno
 - C) A mayor grosor del catéter mayor probabilidad de lesión en la íntima venosa y flebitis mecánica
 - D) Se debe escoger un catéter de longitud media o central de inserción periférica cuando se prevea una duración de terapia intravenosa mayor de seis días